

3 - CONDUITE A TENIR EN CAS D'URGENCE - PARTIE MEDECIN TRAITANT ou à préciser :

Fiche standard et fiches élaborées avec les sociétés savantes pour les pathologies les plus fréquentes sont disponibles sur Eduscol

Fiche spécifique N° 06

Nom/ Prénom :	Date de Naissance :
Numéros d'urgence spécifiques éventuels (autres que le 15 ou le 112) :	
Fiche établie pour la période suivante :	

- Dès les premiers signes, faire chercher la trousse d'urgence de l'enfant ainsi qu'un téléphone portable.
- Rester avec l'élève
- Évaluer la situation et pratiquer :

Signes	Conduite à tenir	Traitement à prendre
Douleur ✓ la douleur n'est pas située au niveau du thorax ✓ absence de fatigue ✓ absence de pâleur ✓ absence de fièvre	- Mettre l'enfant au repos, le réchauffer, lui donner à boire - Prévenir les parents Si la douleur persiste au bout de 30 minutes une consultation médicale est urgente : appeler à nouveau les parents et s'ils ne sont pas joignables très rapidement, appeler le 15 ou le 112	Paracétamol : Forme : Dose : 1 dose toutes les 6 heures si douleur, maximum 4 doses par jour. Autre : Forme : Dose :

- Dès les premiers signes de gravité ou si les signes précédents persistent : appeler le 15 ou le 112

Signes de gravité	Conduite à tenir	Traitement
1 ou plusieurs signes • Fièvre $\geq 38.5^{\circ}\text{C}$ • Pâleur avec fatigue intense ou d'apparition rapide • Douleur au niveau de la poitrine	- Une consultation hospitalière au centre hospitalier référent est urgente : appeler les parents et le SAMU (15 ou 112) - En attendant les secours : mise au repos + lui donner à boire + éviter tout refroidissement	En attendant, en cas de fièvre : paracétamol Forme : Dose : (1 dose toutes les 6 heures si douleur ou fièvre maximum 4 doses par jour) Autre :

TAUX D'HÉMOGLOBINE DE BASE : g/dL

Existence d'une fiche de liaison confidentielle pour le médecin EN

Existence d'un courrier sous pli pour les secouristes

Cachet du médecin :

Date :

Signature du médecin :